



# Guía de examen rápido MAMI

Gestión de lactantes pequeños y en riesgo nutricional de menos de seis meses de edad y de sus madres

## NOTAS:

1. Consultar las tarjetas de orientación y el folleto de acciones de apoyo MAMI.
2. Si existe constancia documental de pérdida de peso o de falta de aumento de peso adecuado (menos de 5 g/kg/día), o si la madre indica que el lactante ha perdido peso o no aumenta de peso, remitir para evaluación MAMI.
3. Se refiere a cualquier modo de alimentación: lactancia materna, sin lactancia materna o mixta.
4. En contextos con una carga de casos elevada o poca capacidad, puede ser necesario reducir el examen a los criterios básicos (Paso 1, signos de peligro AIEPI y Paso 2, antropometría del lactante). De este modo se inscribirá en MAMI únicamente a lactantes con un déficit antropométrico que necesitan asistencia inmediata. Si la capacidad lo permite, se pueden añadir al examen otros criterios (Paso 3, problemas de alimentación del lactante y Paso 4: salud y bienestar maternos), además de los criterios básicos. A finalidad de los criterios de examen adicionales es identificar a lactantes y madres en riesgo pero que no presentan un déficit antropométrico, y evitar que desarrollen un retraso del crecimiento.

## EVALUAR EL

### COMPROBAR:

#### SIGNOS DE PELIGRO GENERALES

- Incapacidad para beber o mamar o vomita todo lo que ingiere
- Convulsiones
- Dificultad para respirar
- Temperatura (alta o baja)
- Letargia o inconsciencia
- Ver AIEPI para más información sobre los signos de peligro

#### MAMI-SPECIFIC DANGER SIGNS

Edema bilateral (+, ++ o +++)

### PREGUNTAR:

- ¿El lactante nació demasiado pronto (premature) o era demasiado pequeño (bajo peso al nacer)? (Información comunicada o documentada)
- ¿El lactante ha perdido peso recientemente o no ha aumentado de peso (esto incluye a neonatos que no han recuperado el peso que tenían al nacer)? (Información comunicada o documentada)

### MEDIR:

PUNTUACIÓN Z DE LA RELACIÓN PESO-EDAD o PERÍMETRO BRAQUIAL

### PREGUNTAR:

- ¿El lactante tiene dificultades para alimentarse?
- ¿Se le dan al lactante otros alimentos o bebidas aparte de la leche materna?
- ¿La madre se muestra inquieta por la alimentación o presenta problemas en los senos? (Información comunicada u observada)

### PREGUNTAR Y OBSERVAR:

- ¿La madre padece alguna enfermedad que también deba ser evaluada? (Información comunicada u observada)
- ¿La madre ha tenido dificultades para cuidar de su lactante o de sí misma recientemente?

### MEDIR:

PERÍMETRO BRAQUIAL

## CLASIFICAR A TODAS LAS MADRES Y LACTANTES

## SIGNOS

### UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES SIGNOS:

- Incapacidad total para alimentarse
- Convulsiones
- Hundimiento acusado del pecho
- Respiración acelerada
- Temperatura corporal alta o baja
- Movimiento únicamente en respuesta a estímulos o ningún movimiento
- Edema bilateral (+, ++ o +++)

### UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES SIGNOS:

- Lactante nacido prematuramente
- Peso bajo al nacer
- Pérdida de peso reciente o falta de aumento de peso
- El neonato no ha recuperado el peso que tenía al nacer al cumplir las dos semanas de edad
- Perímetro braquial menor de 115 mm
- Puntuación Z de relación peso-edad menor de -2

### UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES SIGNOS:

- El lactante tiene dificultades de alimentación
- El lactante recibe otros alimentos o bebidas aparte de la leche materna
- La madre tiene inquietudes sobre la alimentación o presenta problemas en los senos

### UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES SIGNOS:

- La madre tiene una enfermedad que también debe ser evaluada
- La madre indica que ha tenido dificultades para cuidar de su lactante o de sí misma recientemente
- El perímetro braquial de la madre es menor de 230 mm

- No hay signos de enfermedad grave ni de riesgo potencial relacionado con MAMI

## CLASIFICAR

### ENFERMEDAD MUY GRAVE

### RIESGO POTENCIAL

### RIESGO BAJO

## ACTUAR

Proporcionar tratamiento previo a la remisión conforme a AIEPI

Remitir URGENTEMENTE al hospital (para tratamiento de problemas graves más asistencia específica MAMI) o

Si la remisión es RECHAZADA o INVIABLE, tratar en el centro de salud más próximo hasta que la remisión sea viable

Remitir a la madre y el lactante al punto del servicio MAMI más próximo para su evaluación adicional

Felicitar y tranquilizar  
Proporcionar o remitir a atención de salud rutinaria y orientación materna y en alimentación del lactante y del niño