



# Guide de détection rapide MAMI

Prise en charge des nourrissons de moins de six mois, petits et à risque nutritionnel ainsi que de leurs mères

## ÉVALUATION

VÉRIFIER :

### SIGNES DE DANGER

- Incapable à boire ou à téter au sein ou vomissements systématiques
- Convulsions
- Difficulté à respirer
- Température élevée ou basse
- Léthargique ou inconscient
- Se reporter à la PCIME pour le détail des signes de danger

### SIGNES DE DANGER SPÉCIFIQUES À MAMI

Œdème des deux membres (+, ++ ou +++)

### DEMANDER :

- Le nourrisson est-il né avant terme (prématuré) ou trop petit (insuffisance pondérale à la naissance)? (signalé ou constaté par écrit)
- Le nourrisson a-t-il récemment perdu du poids ou n'a-t-il pas réussi à en prendre, y compris un nouveau-né qui n'a pas repris son poids de naissance? (enregistré ou documenté)

### MESURER:

PAZ et/ou PB

### DEMANDER:

- Le nourrisson a-t-il des difficultés à s'alimenter ?
- Le nourrisson reçoit-il habituellement des aliments ou des boissons autres que le lait maternel ?
- La mère a-t-elle un ou plusieurs problèmes d'allaitement ou au niveau des seins ? (selon un rapport ou une observation)

### DEMANDEZ ET REGARDEZ:

- La mère souffre-t-elle d'une maladie nécessitant une évaluation plus approfondie ? (selon un rapport ou une observation)
- La mère a-t-elle récemment eu des difficultés à s'occuper de son enfant ou d'elle-même ?

### MESURER:

Son périmètre brachial

CLASSIFIER TOUS LES RISQUES POUR LA MÈRE ET LE NOURRISSON

## NOTES :

1. Reportez-vous au livret MAMI Counselling Crads et SupportActions.

2. S'il est constaté par écrit que le nourrisson a perdu du poids ou n'a pas enregistré de prise de poids adéquate (soit 5 g/kg/jour), ou si la mère signale que le nourrisson a perdu du poids ou n'en a pas pris, orienter vers des services d'évaluation MAMI.

3. Cette question concerne toutes les méthodes d'alimentation, que le nourrisson soit allaité, non allaité ou reçoive une alimentation mixte.

4. Dans les contextes où le nombre de cas est élevé et/ou les capacités sont limitées, il peut être nécessaire de limiter le dépistage aux critères de base (étape 1 : Signes de danger PCIME + Étape 2 : anthropométrie du nourrisson). Cela limitera l'inscription au MAMI aux nourrissons présentant un déficit anthropométrique existant et nécessitant un soutien immédiat. Si la capacité le permet, dépister des critères élargis (étape 3 : problèmes d'alimentation du nourrisson + étape 4 : santé et bien-être maternels) en plus des critères de base. Les critères de dépistage élargis visent à identifier les nourrissons et les mères à risque mais sans déficit anthropométrique actuel et à prévenir les empêcher de développer un échec de croissance.

## SIGNES

## CLASSIFICATION

## AGIR

### UN OU PLUSIEURS DES SIGNES SUIVANTS:

- Le nourrisson ne peut pas du tout s'alimenter
- Convulsions
- Tirage sous-costal sévère
- Respiration rapide
- Température corporelle élevée ou basse
- Le nourrisson ne bouge que lorsqu'il est stimulé ou ne bouge pas du tout
- Œdème des deux membres (+, ++ ou +++)

### PATHOLOGIE SÉVÈRE

Fournir un traitement préalable à l'orientation conformément à la PCIME

vers un hôpital (traitement problèmes graves et services MAMI)

Si l'orientation est REFUSÉE ou IMPOSSIBLE : traiter dans l'établissement de santé le plus proche jusqu'à ce que l'orientation soit possible

### UN OU PLUSIEURS DES SIGNES SUIVANTS:

- Naissance prématurée
- Insuffisance pondérale à la naissance
- Perte de poids récente ou absence de prise de poids
- Le nouveau-né n'a pas repris son poids de naissance dans les deux semaines suivant l'accouchement
- PB inférieur à 115 mm
- WAZ inférieur à -2

### PRÉSENCE D'UN RISQUE

Orientez la mère et le nourrisson vers le centre de services MAMI le plus proche pour une évaluation plus approfondie

### UN OU PLUSIEURS DES SIGNES SUIVANTS:

- Le nourrisson a des difficultés à s'alimenter
- Le nourrisson reçoit habituellement des aliments ou des boissons autres que le lait maternel
- La mère a des problèmes d'allaitement ou au niveau des seins problem

### UN OU PLUSIEURS DES SIGNES SUIVANTS:

- La mère souffre d'une maladie nécessitant une évaluation plus approfondie
- La mère dit avoir eu des difficultés à s'occuper de son bébé ou d'elle-même récemment
- Le PB de la mère est inférieur à 230 mm

Aucun signe de maladie grave ou de risque relatif à la MAMI

### RISQUE FAIBLE

Féliciter et rassurer

Fournir des services de santé ordinaires, de conseil aux mères et de conseils en matière d'ANJE ou orienter vers de tels services